

Poučenie po protetickom ošetrovaní- fixná protetika, fazety, korunky a mostíky

Dočasné korunky: provizórne korunky alebo mostíky dávame na Vaše zuby dočasne. Majú za úlohu chrániť vaše zuby a ďasná, zatiaľ čo vyhotovia v zubnom laboratóriu Vašu novú náhradu zubov. Okrem toho, tento dočasný prostriedok pomôže zabrániť posunu príľahlých zubov; čím sa zabezpečí, že vaše konečné korunky, alebo mostík bude možné správne nasadiť. Na cementovanie používame dočasný cement, ktorý slúži na to, aby sme provizoriu vedeli bezproblémovo stiahnuť .

- Vyhnite sa žuvaniu žuvačky a jedeniu lepkavých a tvrdých potravín
- Ak je to možné, žujte na opačnej strane úst
- Kefku a dentálnu niť používajte starostlivo každý deň, vyťahujte niť do boku popri dočasných náhradách. Vyťahovanie dentálnej nite „klasickým spôsobom“ môže spôsobiť predčasné uvoľnenie provizórnej náhrady.
- Je dôležité, aby vaše provizórne korunky zostali po celý čas na svojom mieste. Ak sa dočasná korunka, alebo mostík odlepí, kontaktujte nás, aby sme mohli zabezpečiť včasné umiestnenie na pôvodné miesto.
- Mierne až stredne závažné ťažkosti (bolesti) po preparácii na korunky sú bežné. Odporúčame užiť nesteroidné protizápalové lieky, ako je Ibuprofén, Paralén, Valetol alebo Asprin. Ak nie je možné bolesti spoľahlivo utlmiť bežnými prostriedkami, treba sa na nás obrátiť o pomoc.

Citlivosť - Mierna až stredne závažná citlivosť na teplé a studené jedlá a nápoje je normálna po nasadení každej fixnej náhrady . Obvykle sa jedná o citlivosť , ktorá postupne klesá počas obdobia niekoľkých týždňov. Ďasná sa po vpichoch anezesujúcej látky ukludnia v priebehu niekoľkých dní. Veľmi malé percento ľudí pociťuje bolesť aj po dlhšiu dobu. Ak to trvá dlhšie ako šesť týždňov, obráťte sa na našu ambulanciu.

Pulpotómia - V niektorých prípadoch môže byť odstránený kaz , alebo preparácia väčšia a bližšie k nervu; v takom prípade je nutné ošetrovanie koreňového kanálika zuba. V tomto prípade vás budeme informovať o tejto skutočnosti a provizórne korunky budú musieť slúžiť až do doriešenia komplikácie. Cena za ošetrovanie podobných komplikácií nie je zahrnutá v kalkulácii na protetické ošetrovanie a účtuje sa osobitne.

Žuvanie – Je potrebné vyhnúť sa žuvaniu pevných potravín po dobu 24 hodín, aby bolo umožnené dosiahnutie maximálnej pevnosti väzby cementu.

Správna artikulácia novej náhrady – Cementovanie novej náhrady spravidla vykonávame v lokálnej anestézii. Niekedy je aj z tohto dôvodu problematické dosiahnuť optimálnu artikuláciu novej práce v prvom sedení. V prípade ak dodatočne zistíte „predčasný kontakt“ novej náhrady je nutné aby ste sa určite zastavili na doartikulovanie práce. V opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu zuba čo môže viesť až k jeho strate!

Následná starostlivosť - Ak chcete, aby sa vaše nové náhrady boli dlhodobo v top stave, je potrebné dodržiavať správnu hygienu dutiny ústnej aj v mieste nových náhrad. Odporúčame pravidelnú návštevu dentálnej hygieničky. Často zanedbané malé problémy, môžu viesť k predčasnej strate Vašej protetickej práce!